

Pierwszy dzień astronomicznej wiosny 20.03.2020.

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 21.03.2020.

ZMIANA CZASU z ZIMOWEGO na LETNI 29.03.2019.r. z godz.2:00 na godz.3:00

(będziemy zatem spać w niedzielę o jedną godzinę krócej)

W roku 2020 w ramach zaleceń PROCAM dla sadownictwa udostępniamy Państwu:

- **KOMUNIKATY SMS** – Będą wysyłane tylko do osób, które są aktywnymi klientami PROCAM i wypełnili nowy wzór ankiety z RODO, oraz zadeklarowali rodzaje posiadanych upraw. Chęć dopisania siebie lub uaktualnienia upraw można zgłaszać u sprzedawców PROCAM. SMS-y będą wysyłane tematycznie, aby w jak najmniejszym stopniu wysyłać do Państwa SMSy, które Państwa mogą nie zainteresować.

- **KOMUNIKATY VIDEO** – Będą w większości nagrywane osobno dla jagodników, oraz osobno dla sadów. Komunikaty będą umieszczane m.in. na stronie

<https://horti.procam.pl/komunikaty>

- **KOMUNIKATY MAILOWE** – Będą wysyłane do wszystkich, którzy zadeklarowali chęć otrzymywania takich informacji. Komunikaty będą umieszczane także na stronie

<https://horti.procam.pl/komunikaty>

- **FACEBOOK** - Zachęcamy do obserwowania informacji na

<https://www.facebook.com/horti.procam/>

- **DOSTĘP DO WSKAZAŃ POGODOWYCH** - <https://horti.procam.pl/mapa-stacji> Dostęp do tak dużej ilości stacji i'Metos jest możliwy dzięki połączeniu sił przez PROCAM, BAYER i STOWARZYSZENIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI OWOCÓW „PODKARPACIE”.

- **ZALECENIA OPARTE NA DWÓCH TYPACH MODELI CHOROBYCH** – Oprócz tradycyjnie już weryfikowanych modeli chorobowych z firmy Pessl Instruments, w roku 2020 PROCAM dzięki współpracy z firmą PLANTPRESS i BASF będzie dodatkowo weryfikować swoje komunikaty w oparciu o wskazania systemu RIM PRO

- **WIELE ZESZYTÓW TECHNOLOGICZNYCH dla poszczególnych upraw** – Zeszyty te dostępne są u naszych handlowców lub można je pobrać bezpośrednio ze strony

<https://horti.procam.pl/uprawy>

ZALECENIA NA NAJBLIŻSZY OKRES:

NAWOŻENIE: Nawożenie doglebowe – wszystkie gatunki:

Najważniejsze w prawidłowym nawożeniu jest prawidłowe jego zaplanowanie. Wiele osób, zwłaszcza przy wiosennej pogodzie, zbyt wcześnie startuje z azotowym nawożeniem doglebowym. Podając nawozy wieloskładnikowe zapewniamy im dobre rozpuszczenie się zawartych w nich składników pokarmowych, ale zawarty w nich azot, często zostaje zmarnowany (np. wypłukany). Takie podejście często prowadzi do nadmiernych strat azotu, zwłaszcza, jeśli nie stosujemy dawek dzielonych. Szybciej wchodzimy z nawożeniem wieloskładnikowym na plantacje jagodowe niż drzewiaste. W przypadku stosowania nawozów wieloskładnikowych NPK, przez osoby mało cierpliwe lepiej jest korzystać z nawozów opartych na formach azotu innych niż azotanowe. Do takich nawozów z gamy bezchlorkowych zaliczamy: **ELIXIR Supreme 12-12-17, Pro Horti Complex 9-8-18, Eurofertil Top -30 Horti 5-10-15 Eurofertil 33 N-Process 8-8-17.**

W przypadku wyboru nawozów opartych tak na azocie azotanowym jak i amonowym zalecamy wstrzymać się z nawożeniem do stosowania w okresie tuż przedkwitnieniowym. Pierwsza **DAWKA** nawozu **BLAUKORN 12-12-17** lub zawierający dodatkowo inhibitor nitryfikacji DMPP **NovaTec 12-12-17** w zależności od spodziewanego plonu dla wszystkich gatunków sadowniczych powinna oscylować w ilości **200-400 kg/ha.**

Przy zakładaniu nowych nasadzeń polecamy dwa rozwiązania: **Basacote 6M** lub **Top Substra**. Oba produkty ze względu na bezpieczeństwo stosowania, polecane są do stosowania bezpośrednio w strefę systemu korzeniowego świeżo sadzonych roślin w dawce 50g/dołek (dwa płaskie pudełka od zapalek). Wybrany nawóz należy wymieszać z glebą i obsypać sadzone drzewko. **UWAGA – NIE STOSOWAĆ BEZ WYMIESZANIA Z GLEBĄ !**

Na glebach o niskim poziomie próchnicy warto pomyśleć o nawożeniu organicznym. Do tego celu przydatny jest produkt **Fertil / Bioilsa** zawierający 12,5% azotu i 40% węgla organicznego. Polecaną dawką jest 500 kg/ha. Produkt polecany posypowo zwłaszcza na młodych plantacjach, gdzie można dawkować go punktowo na glebę w obrębie korzeni. Można także pomyśleć o nawożeniu mineralno-organicznym w postaci produktu **Belfrutto** – Jest to doglebowy, organiczno-mineralny nawóz NPK (MgS) 6-10-15 (5-5) z borem (B), żelazem (Fe), cynkiem (Zn), z niską zawartością chlorków. Przeznaczony jest do nawożenia m.in. sadów. Dodatek organiczny sprzyja lepszemu pobieraniu składników nawozu oraz zwiększeniu kompleksu sorpcyjnego gleby.

W celu poprawy właściwości próchnicznej gleb poleca się stosowanie dogłębowo w postaci oprysku lub podlewania **Bio-Gen Rewital Pro+** (1 L/ha) który dodatkowo można połączyć z preparatem **Apol-Humus** (5 L/ha). **Bio-Gen Rewital Pro+** zwiększa udział w glebie właściwych szczepów bakterii wpływających na życie biologiczne gleby i przyswajalność uwalnianych z gleby pierwiastków pokarmowych. Miejsca w którym był stosowany wykazują większą zawartość próchnicy na skutek szybszego rozkładu materii organicznej. Natomiast **Apol-Humus** zawierający kwasy humusowe i fulwowe jest swego rodzaju produktem rekompensującym braki nawożenia obornikiem. Dodatkowo produkt zawiera chitozan. Rokroczne stosowanie tego produktu także poprawia właściwości gleby i stymuluje dodatkowo system korzeniowy. Do moczenia korzeni przed sadzeniem i do podlewania roślin można także użyć nawozu stymulującego **Fertiactyl Starter** w stężeniu 0,5-1%

NAWOŻENIE WAPNIEM w okresie wiosennym jest obarczone rywalizacją tego pierwiastka i ryzykiem jego uwsteczniania się zwłaszcza, jeśli w bliskim okresie będzie stosowane nawożenie fosforowe, albo nawożenie obornikiem. Z tego powodu dla osób, które nie zastosowały jesienią nawożenia wapniowego, są to ostateczne chwile do stosowania tego rodzaju nawozów. Właściwe pH gleby decyduje o właściwym pobieraniu składników pokarmowych, a rokrocznie podawane dobre wapno w niewielkich ilościach jest gwarancją występowania w glebie łatwo dostępnych i przyswajalnych przez roślinę kationów wapnia. Z tego powodu polecamy, aby każdego roku jesienią (ewentualnie bardzo wczesną wiosną) stosować około **400 kg** nawozu **Atri-Gran** lub nawozu z dodatkowym działaniem biostymulującym **Physiomax 975**. Tego typu działanie dostarczy glebie świeżych łatwo dostępnych form wapnia, których dalsze pobieranie w okresie okotkwitnieniowym przez drzewa z gleby jest znaczące dzięki tzw. pompie auksynowo-wapniowej.

PORZECZKA CZARNA

Z uwagi na niską opłacalność uprawy i biorąc pod uwagę stosunkowo niską wrażliwość na chlorki tej uprawy, można wykorzystać nawozy chlorkowe np. **PROFOSKA** w ilości 250 kg/ha.

Jednak z uwagi na dobre prognozy cenowe porzeczki czarnej na 2020 rok, warto zadbać o kondycję roślin wybierając nawozy bezchlorkowe np. **Elixir Supreme**, **ProHorti Complex**, **Eurofertil** lub **Blaukorn**,

Kolejna dawka nawozowa będzie polecane dopiero po zawiązaniu się owoców.

TRUSKAWKI

Zalecamy, aby zastosować 200-250 kg/ha jednego z bezchlorkowych nawozów NPK np. **Blaukorn, Elixir Supreme, Eurofertil, ProHorti Complex** lub **Novatec**.

W przypadku rozkładania włókny lub słomy, warto do nawożenia wybrać nawóz **NOVATEC** z uwagi na jego dłuższy okres działania azotu dzięki zastosowaniu inhibitora nitryfikacji DMPP hamującego przechodzenie azotu amonowego w azotanowy.

POLECAMY także na wilgotną glebę oprysk **BiogenREWITAL** 1 L/ha + **ApolHumus** 5-10 L/ha

MALINA JESIENNA MALINA LETNIA AGREST PORZECZKA CZERWONA

NAWOŻENIE DOGLEBOWE - zastosować 250 kg/ha bezchlorkowego nawozu NPK np. **Blaukorn, Elixir Supreme, Eurofertil** lub **ProHorti Complex**. Można także zamiennie zastosować nawożenie mineralno-organiczne w postaci produktu **Belfrutto**.

POLECAMY także na wilgotną glebę oprysk **BiogenREWITAL** 1 L/ha + **ApolHumus** 5-10 L/ha

NAWOŻENIE: NAWOŻENIE POZAKORZENIOWE (oprysk):

W naszych zaleceniach omawiane będą trzy warianty technologiczne:

- 1). Technologia AVALON;
- 2). Technologia tradycyjna;
- 3). Technologia TIMAC Agro.

1). Technologia nawożenia AVALON: Kompleksowe rozwiązanie AVALON zostały opracowane dla **SADÓW ZIARNKOWYCH** i dla **SADÓW PESTKOWYCH**. Koszt nawożenia sadów w okresie pełni owocowania, pozostających w wysokiej kulturze plonotwórczej w tej technologii wynosi około **1 grosz/kg jabłek** i **1½-3 groszy/kg wiśni i czereśni**.

ROZWIĄZANIE POZWALA ZABEZPIECZYĆ NAWOZOWO UPRAWY PRZEZ CAŁY SEZON. JEDNORAZOWY ZAKUP PAKIETU UŁATWIA TAKŻE SPRAWY ZAKUPOWE W DOBIE ZAGROŻEŃ KORONAWIRUSEM I UTRUDNIEŃ W DOSTAWACH I DOSTĘPNOŚCIACH WIELU PRODUKTÓW.

JABŁOŃ GRUSZA – W zależności od rozwoju wegetacji można już podchodzić do stosowania **AVALON start wegetacji**.

AVALON start wegetacji – zawiera azot (N) fosfor (P) i potas (K)

Technologia została już mocno sprawdzona tak pod kątem WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI, bezpieczeństwa stosowania, mieszalności ze środkami ochrony roślin a także pod kątem trwałości mieszaniny zbiornikowej tak środka ochrony jak i nawozu.

<https://horti.procam.pl/aktualnosci-technologie-nawozow-avalon-jeszcze-raz-udowodnila-swoja-jakosc>

Więcej informacji na <https://horti.procam.pl/aktualnosci-avalon-wszystko-czego-potrzebuj-twoje-jablonie>

W **AVALON start wegetacji** z uwagi na ostatnie mrozy warto połączyć ze stymulacją **ImPROver** 0,5-1 l/ha. Należy pamiętać, aby **AVALON start wegetacji** **NIE ŁĄCZYĆ** z produktami miedziowymi!

CZEREŚNIE MORELE WIŚNIE BRZOSKWINIE ŚLIWA

AVALON dla SADÓW PESTKOWYCH

<https://horti.procam.pl/aktualnosci-avalon-pestka-pelny-program-dolistnego-dokarmiania-czeresni-->

Nie zalecamy mieszania **AVALON PESTKA start wegetacji** z preparatami miedziowymi. Mieszanina co prawda wizualnie wygląda stabilnie, ale chemicznie jest już zmieniona.

<https://horti.procam.pl/aktualnosci-avalon-pestka-z-nagroda-horti-tech-2019>

<https://horti.procam.pl/files/ulotka-Avalon-Pestka-2019.pdf>

2). Tradycyjna technologia nawożenia pozakorzeniowego (dolistnego):

W mojej ocenie bardzo rozsądne będzie wraz z ruszaniem wegetacji zastosować nawożenie w oparciu o oprysk **saletrą potasową** (azotan potasu). W okresie bezlistnym dawka saletry potasowej może wynieść 2%, w okresie otwierania się pąków 1%, a tam gdzie jest już aktywna zieleń max 0,5%. Zabieg zwłaszcza ten w okresie występowania liści zaleca się łączyć z preparatem **ImPROver** w dawce 1 l/ha i stosować dla bezpieczeństwa działania saletry potasowej w okresie wieczornym na suchy liść.

Na początku wegetacji, ale w okresie już wyraźnego ulistnienia dla lepszego startu i dalszego rozwoju oraz dla podniesienia mrozoodporności należy zasilić drzewa: **ProHorti Zn+B** (4,0 kg/ha) w połączeniu w przypadku tradycyjnego przebiegu pogody z **ProHorti Plus NPK 20-20-20** a z **ProHorti Plus K 5-10-45** po zaobserwowaniu uszkodzeń po mrozach.

WDRAŻAMY

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA

3). Technologia nawożenia TIMAC

Na początku wegetacji dla lepszego startu i dalszego rozwoju oraz dla podniesienia mrozoodporności należy zasilić drzewa **Fertileader Leos** (jabłoń 3 l/ha, grusza 3-5 l/ha, rośliny jagodowe 3 l/ha).

Początek wegetacji jest czasem na dostarczenie rośliną cynku-boru. W ten sposób będziemy już przygotowywać rośliny do okres kwitnienia. **Fertileader Leos** jest produktem, który dobrze wkomponowywane się w schemat wzmacniania pąków kwiatowych. Poza mikroelementami jak cynk i bor zawiera on wyselekcjonowane algi morskie. Kompleks SEACTIVE składa się z aminokwasów roślinnych poprawiających wchłanianie dostarczonych składników, w jego skład wchodzi również Izopentynadeniny, w celu przyspieszenia w roślinie przepływu składników pokarmowych. Dodatkowo zawiera Glicynę i Betainę w celu niwelowania stresów pogodowych, warto zwrócić na to uwagę w kontekście wczesnej wiosny i możliwych przymrozków

(stosowanie rozwiązań doglebowych **Physiomas, Eurofertil, Fertiactyl Starter** zostało omówione w dziale nawożenia doglebowego)

OCHRONA:

Należy **LUSTROWAĆ SADY i JAGODNIKI POD KĄTEM SZKODNIKÓW** (tarczniki, mszyce, kwiecieńki, wielkopąkowce, przędziorki i in.)

JABŁOŃ – TARCZNIK – Wzrasta zagrożenie tym szkodnikiem. Na obecnym etapie zabieg olejami (2%) częściowo zabezpieczy rośliny i ograniczy nieco presję szkodnika, a przy okazji ograniczy populację przędziorków. Zabiegów olejami nie należy wykonywać jeśli na najbliższe dni przewiduje się ryzyko występowania przymrozków.

GRUSZA - MIODÓWKI. Obecnie występuje niebywała aktywność miodówki gruszowej plamistej. Miodówki zaczynają swoją aktywność już po kilku cieplejszych dniach. Obecnie w czasie lustracji sadów można zaobserwować w ciepłe dni nawet po kilkanaście dorosłych osobników na pojedynczych pędach. Wczesną wiosną stosowanie preparatów nieselektywnych pozwala na ograniczenia szkodnika przy małym wpływie na straty wśród populacji fauny pożytecznej. Pozwala to także na zastosowanie w sezonie rotacji insektycydów co w praktyce ogranicza możliwości uodparniania się miodówki na preparaty owadobójcze. Bardzo dobrym efektem w zwalczaniu tego szkodnika cechuje się produkt **SILTAC EC** polecane wczesną wiosną w stężeniu **0,2% (2 litry preparatu na 1000 litrów wody starcza na 2 ha sadu)**. Ważne jest aby cieczą dokładnie opryskać drzewa, ale aby ciecz stosunkowo szybko wyschła. Stosowanie **SILTAC EC** nie jest limitowane i nie nosi ryzyka uodparniania się szkodników ze względu na mechaniczno-fizyczne jego działanie. W fazie ulistnienia stężenie preparatu **SILTAC EC** obniżamy do **0,15%** a przy stosowaniu łącznym z insektycydami stężenie możemy obniżyć do **0,1-0,12%**.

WDRAŻAMY

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA

W początkowych okresach wegetacji zastosowanie mogą mieć także pyretroidy (uwaga na rejestrację). Ich działanie mimo często wąskich rejestracji, w praktyce jest totalne, toteż uzasadnione jest tylko w początkowym okresie wegetacji, kiedy to owady pożyteczne nie wykazują jeszcze dużej aktywności. Pyretroidy ograniczyć mogą mszyce, miodówki, kwieciaki, paciornicę, motyle dające początek gąsienicom zjadającym liście itp.

Rejestrację na te szkodniki mają także typowe insektycydy m.in. np. **Piorun 200 SL**, jednak brak odpowiednich temperatur i ilości tkanki roślinnej podpowiada, aby te preparaty stosować w późniejszym okresie.

JABŁOŃ GRUSZA – obserwowany rozwój zarodników parcha przestał być chwilowo groźny, jednak spodziewane kilkudniowe ocieplenie powiązane z większym uwilgotnieniem spowoduje szybszy rozwój dojrzewania nowych zarodników. BEZWZGLĘDNIE w sadach ziarnkowych należy stosować zabezpieczanie ran w oparciu o preparaty miedziowe co będzie także zabezpieczeniem przed ewentualnym zagrożeniem ze strony parcha. Stosowanie nawozów miedziowych o identycznych substancjach aktywnych co środki ochrony roślin, nakazuje logiczne podejście do ochrony i nie dublowanie w jednym zabiegu fungicydów miedziowych i nawozów miedziowych. Nawozy miedziowe wykazują działanie fungistatyczne i są często oparte na analogicznych substancjach co zarejestrowane środki ochrony roślin.

Stosowanie zabiegów nawozowych i ochroniarskich naprzemiennie pozwala na rozsądniejsze udokumentowanie ilości zabiegów w ewidencjach.

CZEREŚNIE MORELE WIŚNIE BRZOSKWINIE ŚLIWA
BRUNATNA ZGNILIZNA DRZEW PESTKOWYCH: Na tym etapie polecamy stosowanie produktów miedziowych. W przypadku braku odpowiednich rejestracji, albo w przypadku ograniczeń etykietowych, należy pamiętać, że fungistatyczne nawozy miedziowe mogą stanowić ratunek.

Kędzierzawość liści brzoskwini: Ostatnie momenty na wykonanie zabiegu. Grzyb najprawdopodobniej częściowo już wrósł do pąków.: Z racji niskich dawek rejestracyjnych skuteczność środków ochrony opartych na dodynie (Syllit, Carpena) może być niewystarczająca. Można się jeszcze wesprzeć podnosząc dawkę miedziowych środków ochrony roślin nawozami miedziowymi (**Seicos 85 WP, Miedź Extra**). Późno-jesienne stosowanie miedziowych defoliacji niemal całkowicie zapobiega problemowi tej choroby.

PORZECZKA CZARNA TRUSKAWKI

Mimo, IŻ WIDOCZNE SĄ OBJAWY WYSTĘPOWANIA WIELKOPĄKOWCA PORZECZKOWEGO, nie jest to jednak jeszcze ten okres w którym byłoby uzasadnione stosowanie walki z tym szkodnikiem. Na obecnym etapie mogą mieć jeszcze zastosowanie preparaty oparte na olejach parafinowych, ale aby wyeliminować fitotoksyczność, nie należy ich stosować w okresach

WDRAŻAMY

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA

występowania przymrozków. Preparaty te zwalczają także przędziorki. W okresie niepewnym temperaturowo, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest stosowanie preparatu SILTAC EC. Działa on bardzo szybko, ale należy pamiętać, aby nie stosować nadmiernej ilości cieczy roboczej, bo preparat działa tym lepiej im dobrze rozprowadzona ciecz po całej roślinie szybciej wyschnie. Zalecane stężenie preparatu SILTAC EC wynosi 0,2% czyli 2 litry/ 1000 cieczy roboczej co powinno wystarczyć na 2-3 ha porzeczek czarnej.

Wsparcie w ochronie mogą być także produkty nawozowe np. **ARYSTA SIARKA 80 WG** lub **PENNTIOL** z UPL w dawce 4-6 kg/ha stosowana przemiennie lub łącznie z **MIEDŹ EXTRA 50 WP** 1,5 kg/ha. Produkty siarkowe ograniczają przędziorki, roztocza i wielkopąkowce a z chorób głównie amerykańskiego mączniaka, natomiast produkty miedziowe opadziny liści i rdzy. Należy unikać opryskiwania miedzią i siarką (a zwłaszcza siarką) upraw w okresie słonecznej i upalnej pogody ze względu na możliwość poparzenia liści roślin. Ewentualne stosowanie tych produktów przy wspomnianych warunkach powinno wiązać się ze zmniejszeniem dawek produktów.

HERBICYDY – ZABIEGI CHWASTOBÓJCZE:

Na wielu plantacjach pokazały się już kwitnące chwasty. Zabiegi zwalczające należy wykonywać po oblocie pszczoł

TRUSKAWKI **AGREST** **MALINA**
PORZECZKA CZARNA **PORZECZKA CZERWONA**

Rozwiązaniem dogłębowym na ten okres mogą być:

Stomp Aqua 455 SC – najlepiej na czystą od chwastów i płaską glebę. Dokładność pokrycia gleby ma znaczenie dla skuteczności zabiegu. Nie należy tego herbicydu mieszać z glebą. Dawki 2,5-3,5 l/ha w zależności od uprawy: malina i jeżyna 3 l/ha, porzeczki i agrest 3,5 l/ha,

Drugie dogłębne rozwiązanie herbicydowe w uprawie roślin jagodowych to **napropamid Devrinol / Colzamid**, które mogą być mieszane z glebą i dlatego nie ma przeszkód do zastosowania przed uprawkami w truskawkach czy jagodnikach.

Dawki 3-4 l/ha na plantacjach młodych, oraz 4-6 l/ha na plantacjach starszych,

GRUSZA **CZEREŚNIE** **MORELE** **WIŚNIE** **BRZOSKWINIE** **ŚLIWA**
ORZECH WŁOSKI **LESZCZYNA**

Stomp Aqua 455 SC - możliwość wykorzystania dogłębowego rozwiązania w dawce 3,5 l/ha. Istnieje możliwość zastosowania dawek dzielonych dwukrotnie po 1,75 l/ha. W niektórych uprawach termin wiosenny określany jest na: od fazy białego/różowego pąka.

JABŁOŃ – możliwość wykorzystania doglebowego rozwiązania w postaci **Diflanil 500 SC** w dawce 0,6 l/ha

JABŁOŃ GRUSZA – W przypadku szybkiego rozwoju chwastów, warto jeszcze przed kwitnieniem wykonać zabieg herbicydowy belką herbicydową w rzędach drzew w oparciu o zarejestrowane rozwiązania oparte o glifosat jak **Gallup** czy **Agrosar** (uwaga – etykieta: gatunki i terminy). Zabieg można połączyć z produktami opartymi o **MCPA** (Chwastox itp.)

Można także korzystać z rozwiązań gotowych: **Orkan 350 SL** 5-8 l/ha stanowiący gotową mieszaninę glifisatu i MCPA. Z uwagi na oprysk tylko rzędów w praktyce dawka 3-4 l/ha sadu bywa wystarczająca przy początkowych fazach rozwojowych chwastów.

PROMOCJE oraz INFORMACJE DODATKOWE:

O AKTUALNE PROMOCJE PROSZĘ PYTAĆ NASZYCH HANDLOWCÓW I SPRZEDAWCÓW.

Z UWAGI NA SPRAWY LOGISTYKI WARTO JUŻ DZISIAJ ZADBAĆ O NAWOZY I PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN. WARTO JE SZYBCIEJ POZAMAWIAĆ NA TEN BARDZO NEWRALGICZNY OKRES. Dodatkowym argumentem jest ryzyko wzrostu cen z uwagi na rosnący kurs walut względem złotego.

W trosce o zdrowie naszych klientów i pracowników wprowadzamy procedury zakupowe. Najlepiej zadzwonić do doradcy lub sklepu PROCAM, zamówić towar i ustalić zasady dostawy / odbioru towaru bez konieczności wchodzenia do punktu handlowego. Jest to najlepszy sposób na zakupy w okresie kłopotów dostaw.

INFORMUJEMY. Jedynym jeszcze dostępnym produktem na rynku zawierającym ditianon (substancja czynna w Delan/Daneel) jest produkt FABAN zawierający dodatkowo pirymetanal. Stosować FABAN można do 4x/sezon od fazy pęknięcia pąków do fazy gdy owoc jabłoni i gruszy osiąga 70% wielkości. Zachęcamy do rotacji środków co pokazujemy w naszych zeszytach technologicznych

<https://horti.procam.pl/files/Zeszyt-technologiczny-jablon.pdf>

Krzysztof Gasparski, PROCAM Polska Sp. z o.o., E-mail: krzysztof.gasparski@procam.com.pl

WDRAŻAMY

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA