


RAMOWY PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO JABŁONI



MIESZALNOŚĆ nawozów AVALON

	AVALON START WEGETACJI	AVALON MYSIE UCHO/ ZIELONY PĄK	AVALON RÓŻOWY PĄK	AVALON KONIEC KWITNIENIA	AVALON WZROST OWOCÓW I	AVALON WZROST OWOCÓW II	AVALON PO ZBIORACH
ImPROver	+						
Delan 700 WG / Daneel	+	+	+	+	+	+	
Delan Pro	+	+	+	+	+	+	
Orthocide WDG/Captan 80 WDG		+	+	+	+	+	
Regalis Plus 10 WG			+	+			
Indofil 80 WP				+	+	+	
Bellis 38 WG					+	+	
Seicos 85 WP	-						+
Miedź Extra 50 WP/Blucos 50 WP	-						+
Miedź Extra 380 SC	-						+

- UWAGI:
- Koncentrat aminokwasowy NaturalCrop SL przyspiesza pobieranie składników pokarmowych, działa ostonowo oraz wpływa na wzrost efektywności dokarmiania dolistnego. W technologii Avalon przy stosowaniu dawek cieczy roboczej poniżej 500 l/ha dodatek aminokwasów staje się konieczny.
 - Zabiegi należy wykonywać w dni pochmurne lub po zachodzie słońca w temperaturach 10-25°C.
 - Zalecana dawka cieczy 500-750 l/ha.

Plantivax
Ochrona bez pozostałości

- Brak pozostałości.
- Brak odporności patogenów.
- Nie uszkadza kwiatów, nie powoduje ordzawień liści ani zawiązków.
- Możliwość łącznego stosowania z innymi środkami ochrony roślin.

UPL Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, www.upl-ltd.pl

UPL
OpenAg[®]
po połączeniu UPL i Arysta LifeScience

Za środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Przeczytaj również informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i środki ostrożności. Nie stosuj środków w sposób niezgodny z etykietą.

Produkty znajdujące się w publikacji należy stosować zgodnie z etykietami rejestracyjnymi. Sposób przechowywania, technologia i termin zabiegu, czynniki pogodowe, gleba odmiany, dawki, mieszanki, występowanie odpornych organizmów, jakość wody użytej do zabiegów wpływa na działanie i efektywność zabiegów. W warunkach niekorzystnych nie można wykluczyć uszkodzeń roślin uprawnych. Sprzedawca i producent nie ponoszą odpowiedzialności za takie sytuacje. W przypadku wykonywania mieszanin należy wykonać próbę na kilku roślinach.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZESZYT TECHNOLOGICZNY JABŁOŃ

Sady deserowe

NIE PRODUKUJĘ PRZEMYSŁU

**WDRAŻAMY
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA dla OGRODNICTWA**

Oddział Łowicz • Sromów 36 • 99-414 Kocierzew • tel. +48 46 838 00 78
Oddział Sandomierz • Chwałki 45A • 27-600 Sandomierz • tel. +48 15 832 33 97
Oddział Grójec • Lisów 4 • 05-610 Goszczyn tel. +48 728 907 483
Oddział Wieliczka • 32-020 Sułków 222, tel. +48 504 904 416

RAMOWY PROGRAM OCHRONY JABŁONI

1	Miedź Extra 50 WP 1,5-3 kg/ha lub Miedź Extra 380 SC 1,5-3 l/ha + Arysta Siarka 80 WG 6 kg/ha		Daneel/Delan 700 WG 0,5 kg/ha + FosMagnum 1-1,5 l/ha		Orthocide WDG 1,9 kg/ha + Discus 50 WG 0,2 kg/ha	Daneel 0,5 kg/ha lub Orthocide WDG 1,9 kg/ha	Orthocide WDG 1,9 kg/ha + FosMagnum 1-1,5 l/ha		Orthocide WDG 1,9 kg/ha + Alcedo 100 EC 0,4 l/ha	Orthocide WDG/Captan 80 WDG 1,9 kg/ha						
2			Daneel/Delan 700 WG 0,5-0,75 kg/ha + Arysta Siarka 80 WG 6 kg/ha	Daneel 0,5 kg/ha + Cindo 50 EW 0,4-0,5 l/ha		Orthocide WDG 1,9 kg/ha + Sercadis 0,25-0,3 l/ha		Orthocide WDG 1,9 kg/ha + Discus 500 WG 0,2 kg/ha	Orthocide WDG 1,9 kg/ha							
3						Faban 500 SC 1,2 l/ha		Bellis 38 WG 0,8 kg/ha lub Zumba Plant 1-1,5 kg/ha								Geoxe 50 WG 0,45 kg/ha lub Zumba Plant 1-1,5 kg/ha
4																
Olej 95 EC 2%		Pyretroid – przy wyborze kierować się aktualnymi rejestracjami		Runner 240 SC 0,4 l/ha + Siltac EC 0,15%		Podczas KWITNIENIA zabiegi wykonywać w porze nocnej		Piorun 200 SL 0,2 l/ha + Siltac EC 0,1%		Coragen 200 SC 150-175 ml/ha		Teppeki 50 WG 140 g/ha lub Piorun 200 SL 0,2 l/ha + Siltac EC 0,1%		Coragen 200 SC 175 ml/ha		
				Mector Pro 018 EC 0,75 l/ha + Zoom 110 SC 0,45 l/ha (stosować 1 x w sezonie)				Teppeki 50 WG 140 g/ha + Steward 30 WG 170 g/ha		Mector Pro 018 EC 0,75 l/ha + Zoom 110 SC 0,45 l/ha (stosować 1 x w sezonie)		Steward 30 WG 200 g/ha lub Runner 240 SC 0,4 l/ha		Affirm 095 SG 2,5-3 kg/ha		
Eruca 1 kg/ha (aktywność 14-21 dni)																
																
NABRZMIWANIE PĄKÓW	PĘKANIE PĄKÓW	MYSIE UCHO	ZIELONY PĄK	RÓŻOWY PĄK	POCZĄTEK KWITNIENIA	PEŁNIA KWITNIENIA	KONIEC KWITNIENIA	PO KWITNIENIU	WZROST ZAWIĄZKÓW	CZERWCOWY OPAD ZAWIĄZKÓW	WZROST OWOCÓW I POŁOWA LATA	WZROST OWOCÓW II POŁOWA LATA	6 TYGODNI PRZED ZBIORAMI	3 TYGODNIE PRZED ZBIORAMI	3-7 DNI PRZED ZBIOREM	
					Regalis Plus 0,7 -1 kg/ha + Regulex 10 SG 50 g/ha				Regalis Plus 0,6-0,8 kg/ha		Regalis Plus 0,5-0,7 kg/ha					
					Plantivax 0,75 l/ha (zaraza ogniowa – do 5 zabiegów w sezonie)					Promalin 0,25-0,75 l/ha lub Regulex 10 SG 50 g/ha		Promalin 0,25-0,75 l/ha lub Regulex 10 SG 50 g/ha				
							Pomonił 10 SL 0,3-0,5 l/ha + Mocznik 1-1,5%		Maxcell 5-7,5 l/ha lub Maxcell 3,6-5 l/ha + Pomonił 0,1 l/ha							

1 – dla odmian podatnych na parcha
2 – dla odmian podatnych na mączniaka i parcha

3 – dodatkowe zabiegi w przypadku owoców przeznaczonych do przechowywania
4 – brak jest aktualnych rejestracji do zwalczania alternarii.
Proponowane rozwiązania ograniczają występowanie patogena.

Uwagi:
Przy dużej presji bawleńnicy korówki produkty Piorun 200 SL oraz Teppeki 50 WG należy mieszać z produktem Siltac EC w stężeniu 0,1%.